



تل کی کاشت



Ph: +92-51-5836313, 51-2830591
Email: info@biofruitpakistan.com
Web: www.biofruitpakistan.com.pk

تل کی کاشت

تعارف:

تل کے بیجوں میں تقریباً 50% فیصد تیل اور 22% فیصد پروٹین ہوتی ہے۔ جبکہ کھل میں 42% فیصد پروٹین ہوتی ہے۔ اسکا تیل کھانے کے علاوہ زیادہ تر ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ تل کنفلکشنری اور روغنی نان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان میں تل کی فصل کا اوسط رقبہ 99-1998 میں 171100 ایکڑ تھا اور اوسطاً پیداوار فی ایکڑ 200 کلوگرام تھی۔ تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ تل کی ترقی دادہ اقسام میں 800 کلوگرام فی ایکڑ پیداوار دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ لہذا زمین دار بھائیوں کی چاہئے کہ تل کی فصل زیادہ سے زیادہ رقبہ پر کاشت کریں اور منافع بخش پیداوار حاصل کرنے کیلئے مندرجہ ذیل سفارشات/مشوروں پر عمل کریں۔

زمین کا انتخاب اور تیاری:

تل کی کاشت کیلئے ہلکی ریتیلی اور درمیانی میرا زمین جسمیں پانی جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہو، نہایت ہی موزوں ہوتی ہے۔ راؤنی یا بارش کے بعد جب زمین وتر میں آجائے تو دو تین بار ہل چلا کر اور ایک سہاگہ لگا کر زمین کو بھڑ بھڑ اور اچھی تیار کر لیں۔

وقت کاشت:

مختلف صوبوں میں تل کی کاشت کیلئے موزوں وقت درجہ ذیل ہیں:-

صوبہ سندھ: 15 جون تا 15 جولائی

صوبہ پنجاب: یکم جولائی تا آخر جولائی

صوبہ سرحد: 15 جولائی تا آخر جولائی

موزوں اقسام:

تاے پنجاب-90، پی=7-40

شرح بیج:

قطاروں میں کاشت کیلئے 2 کلوگرام فی ایکڑ اور اگر کاشت بذریعہ چھٹے کی گئی ہو تو 2.5 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کرنا

چاہئے۔

طریقہ کاشت:

تل کی کاشت بذریعہ ٹریکٹر ڈرل یا پھر عام طور سے قطاروں میں کریں۔ قطاروں کا درمیانی فاصلہ 45 سنی میٹر یعنی

1-1/2 فٹ ہونا چاہئے۔ بیج تقریباً 2 سنی میٹر گہرائی تک کاشت کرنا چاہئے تاکہ فصل کا اگاؤ جلدی اور تیز ہو سکے۔

کھاد کا استعمال:

ایک بوری ڈے اے پی اور آدھی بوری یوریا فی ایکڑ کے حساب سے ملا کر یا ایک بوری نائٹرو فاس اور آدھی بوری یوریا ملا کر بوائی کے وقت

ڈالیں۔ اگر آدھی بوری یوریا ملا کر بوائی کے وقت ڈالیں۔ اگر آدھی بوری یوریا پہلے پانی کے ساتھ بھی ڈال دیں تو پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔

پودوں کی چھد رانی اور گوڈی:

کاشت کے تقریباً ایک ہفتہ بعد بیج کا اگاؤ مکمل ہو جاتا ہے۔ کاشت کے تقریباً 15 تا 20 دن بعد فالتو اور کمزور پودے نکال دیں تاکہ پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 تا 15 سنٹی میٹر رہ جائے۔ پہلی گوڈی پہلا پانی دینے کے بعد کریں دوسری گوڈی دوسرے پانی یا بارش کے بعد کریں۔ گوڈی بذریعہ ہل یا ٹریکٹر سے بھی کی جاسکتی ہے۔

آبیاشی:

تل کی فصل کو عموماً تین تا چار بار پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو پہلا پانی اگاؤ کے 15 تا 20 دن بعد لگانا چاہئے۔ دوسرا پانی بھی 15 تا 20 دن بعد لگانا چاہئے۔ تیسرا پانی پھول اور ڈوڈیاں آنے پر لگانا چاہئے۔ چوتھا پانی ضرورت پڑے تو لگائیں۔

بیماریاں اور علاج:

اس فصل پر کئی قسم کی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ جو کہ پیداوار میں کمی کا سبب بنتی ہیں۔ انکی وجہ سے تیل کی خوبی اور خاصیت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تل کی فصل کی اہم بیماریاں حسب ذیل ہیں:-

(1) پھیپوندی اور جراثیمی جھلساؤ:

ان بیماریوں کا حملہ پھیپوندی اور مختلف جراثیموں، سوڈوموناس اور زنتھوموناس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گرم مرطوب موسم میں پتوں پر بھورے یا سیاہ رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جو کہ شدید حملے کی صورت میں آپس میں مل جاتے ہیں۔ جسکی وجہ سے سارے پتے اور تے سوکھ جاتے ہیں۔ اور فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

اس بیماری سے بچاؤ کے لئے مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا چاہئے۔

(i) صحت مند بیج استعمال کریں۔

(ii) بجائی سے پہلے بیج کو پھیپوندکش دوا ضرور لگائیں۔

(iii) بیماری کا حملہ شروع ہونے سے پہلے ہینٹل بحساب 500 گرام فی ایکڑ پانی میں ملا کر دو یا تین اسپرے کریں اور اسپرے کے درمیان وقفہ 10 تا 15 رکھیں۔

(2) جڑ کا سوکھنا:

یہ بیماری پودے کی جڑوں پر حملہ آور ہوتی ہے جسکی وجہ سے پودے مرجھا جاتے ہیں۔ اور سوکھ جاتے ہیں۔ اور فصل کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہ بیماری پھیپوندی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس سے بچاؤ کیلئے صحت مند بیج کا استعمال کرنا چاہئے اور کاشت سے پہلے بیج کو پھیپوندکش دوا لگانی چاہئے۔

حشرات اور انکا علاج:

تل کی فصل کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مثلاً لیف رولر سفید مکھی اور تل گال مکھی قابل ذکر ہیں۔ ان کیڑوں سے بچاؤ کے لئے ڈائی کیمران %100 فیصد، سوی سائیڈ ان 20 ای سی اور نوکران بحساب 210 سے 250 ملی لیٹرز یا میتھائل پرتھیان بحساب 350 تا 500 ملی لیٹرز فی ایکڑ پانی کی مناسب مقدار میں ملا کر اسپرے کریں اور ہر اسپرے کے درمیان وقفہ دس دن رکھیں۔

وقت برداشت:

یہ فصل تقریباً 100 سے 120 دنوں میں پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ لہذا جب ڈوڈیاں پھلیاں تین چوتھائی زرد پڑ جائیں تو فصل کاٹ لیں اور چھوٹے چھوٹے بنڈل بنا کر سیدھا رخ کھڑا کر دیں اور خشک کر لیں۔ کٹائی کے ایک ہفتہ بعد انکو چھاڑ لیں بیج نکالنے کے بعد اسکو اچھی طرح دھوپ میں خشک کر لیں۔

پیداوار:

اگر فصل جدید طریقہ سے کاشت کی گئی ہو تو 500 سے 600 کلوگرام فی ایکڑ پیداوار حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن ترقی دادہ اقسام میں 800 کلوگرام فی ایکڑ پیداوار دینے کی صلاحیت موجود ہے۔

بائیو آئل فروٹ پاکستان اپنے کسان بھائیوں کیلئے مزید رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
مزید معلومات، مشاورت فنی اور تکنیکی سہولیات کیلئے نیچے دیئے گئے درج ذیل
نمبرز پر رابطہ کریں۔



BIO OIL FRUIT

Ph: +92-51-5836313, 51-2830591, Cell: +92-300-6909342
Email: info@biofruitpakistan.com | Web: www.biofruitpakistan.com.pk