



# پاکستان میں بھیڑ بکریوں کی افزائش



Ph: +92-51-5836313, 51-2830591  
Email: info@biofruitpakistan.com  
Web: www.biofruitpakistan.com.pk

## پاکستان میں بھیڑ بکریوں کی افزائش

### تعارف:

بھیڑ اور بکریاں پالنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ بکریاں گوشت اور بھیڑ گوشت اور اون کے حصول کیلئے نہایت مفید جانور ہے۔ جبکہ ان کی کھالیں لیڈر انڈسٹری کیلئے قلییدی مقام رکھتی ہیں۔

پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی خوردنی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے اور زرعی ملک ہونے کے ناطے کاشتکار کی آمدنی میں اضافہ کیلئے ضروری ہے۔ کہ ہم انکی اجزائش جدید خطوط پر کریں۔ پاکستان میں بھیڑ، بکریوں کی عمدہ نسلیں موجود ہیں۔ جو مختلف پہاڑی اور میدانی علاقوں کے موسم کی مناسبت سے موجود آب و ہوا میں بخوبی نشوونما پانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔

### اقسام:

بکریوں میں پتیل، دائردین پناہ، بربری، کاموری، دامانی اور ٹیڈی جب کہ بھیڑوں میں لوسی، تھلی، کچلی، بچی، کھچی، بلوچی، وزیرتی، برنائی، ہشت نگری، مچنی، تراہی اور بہرک پاکستان میں پائی جانے والی اقسام ہیں۔

### باڑے کی تعمیر:

بھیڑ بکریوں کیلئے باڑہ ہمیشہ اونچی جگہ پر بنایا جائے تاکہ برسات میں بارش کا پانی باڑے میں جمع نہ ہو سکے۔ باڑے کا رخ شمالاً جنوباً رکھا جائے۔ کچے باڑے کی صورت میں دیواریں زمین سے دو فٹ اوپر تک پختہ ہوں۔ باڑے کے قریب سایہ دار درخت ہوں تو بہتر ہوگا تاکہ گرمی میں جانور سائے تلے آرام کر سکیں۔ ایک ٹیڈی بکری کے لئے 12 مربع فٹ اور بڑی بکری اور بھیڑ کے لئے 16 مربع فٹ چھتی ہوئی اور اس سے دو گنی جگہ صحن کے طور پر ہونی چاہئے۔

### جانوروں کا انتخاب:

بھیڑ، بکریاں صحت مند اور جوان خریدی جائیں۔ تین چار ماہ کی حاملہ بھیڑ، بکریاں پھر تیلہ مزاج، جسم گتھا ہوا۔ دیکھنے میں خوبصورت اور حوانہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہوں۔ جڑواں پیدا شدہ ماں باپ میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ 25 بھیڑ/بکریوں کے لئے ایک بکریا مینڈھا کافی ہوتا ہے۔ بھیڑوں کی نسل کشی میں بکریا مینڈھا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ صحت مند ز جانور صحت مند بچوں کی پیدائش کا ضامن ہوتا ہے۔ لہذا بکریا / مینڈھا سرکاری فارم سے خریدیں جہاں جانوروں کی پرورش جدید خطوط پر کج جاتی ہے۔

### فارم پر لانے سے پہلے حفاظتی تدابیر:

نئی بھیڑ بکریوں کو فارم پر لانے سے پہلے باڑہ کی صفائی کروائی جائے۔ معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکا جائے۔ نئی خریدی گئی بھیڑ/بکریوں کو دس دن تک علیحدہ جگہ پر رکھ کر ان کا معائنہ سفارش کردہ ادویات اور حفاظتی ٹیکے لگوا کر فارم پر پہلے سے موجود بکریوں میں شامل کیا جائے۔

### نسل کشی:

بھیڑ/بکریوں کا زمانہ حمل 146 سے 150 دن ہے۔ انہیں یکم جولائی سے 15 ستمبر تک نہیں ملانا چاہئے۔ تاکہ شدید سردی کے موسم میں پیدا ہو کر بچے موت کا شکار نہ ہوں بکریوں کے ملاپ کا بہترین وقت مارچ اپریل یا اکتوبر نومبر ہے۔ اس طرح بچوں کی پیدائش معتدل موسم میں ہوگی۔ نومولود بچوں کو شدید سردی سے بچانا از حد ضروری ہے۔ بچوں میں شرح اموات بڑھنے کی بڑی وجہ سردی ہے۔

## حاملہ بھیڑ، بکریوں کی دیکھ بھال:

حاملہ بھیڑ، بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کا خصوصی خیال رکھنا چاہئے۔ حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی سے اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں ان کو باقی ماندہ ریوڑ سے علیحدہ کر کے باڑوں میں رکھا جائے تاکہ آرام سے رہ سکیں اور اگر ونڈا دینا مقصود ہو تو علیحدہ آرام سے اپنا حصہ کھا سکیں۔ خوراک میں نمکیات خصوصاً کمپلیم، فاسفورس، کاپر اور آئیوڈین کی کمی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہئے۔ دوسری باتوں کے علاوہ حاملہ بھیڑ، بکریوں کے حوانہ کی دیکھ بھال، دن میں کپڑے کا تھیلہ چڑھانا اور ہر صورت میں حوانہ کو زخمی ہونے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ حوانی زخمی ہونے کی صورت میں جانور دوسری بیماریوں کا آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ نیز نومولود بچے ماں کا دودھ پینے سے محروم رہتے ہیں۔

## زچگی کا عمل:

زچگی کے عمل کے لیے علیحدہ ڈربے جن کی لمبائی و چوڑائی ٹیڈی بکری کے لیے 4 مربع فٹ اور بڑی بکری اور بھیڑ کے لیے 6 مربع فٹ کا انتظام کرنا چاہئے۔ بھیڑا بکری بیائے جانے کے بعد بچوں کو ناک، منہ اور آنکھیں سے جھلی وغیرہ صاف کر کے نتھنوں میں پھونک ماریں اور آنتوں کو ناف سے ایک انچ کے فاصلے پر گرہ لگانے کے بعد قینچی سے کاٹ کر نکچر آئیوڈین لگادیں۔ زچگی سے ایک آدھ دن پہلے حاملہ بھیڑا بکری کو علیحدہ جگہ پرالی وغیرہ بچھا کر رکھا جائے۔

## زچگی کے بعد:

کچے باڑے کی صورت میں بچے دیواریں چائنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں لکڑی کے 2 فٹ اونچے کھونٹے زمین میں مختلف مقامات پر گاڑ کر نمک کے دوڑھائی کلوگرام وزنی ڈھیلوں میں سوراخ کر کے تار کے ذریعے کھونٹوں کے ساتھ زمین سے "6 انچ اونچائی پر لٹکا دیں۔ 15 دن تک بچے ماں کے ساتھ رہنے چاہئیں۔ تاکہ وہ آسانی سے دودھ پی سکیں۔

## چھانٹی:

بیمار، لاغر، بانجھ، زیادہ عمر، حمل گرا دینے والی جنسی مرض میں مبتلا، دیر سے جوان ہونے والی، بہا پنے کے 6 ماہ تک حاملہ نہ ہونے والی یا ہر بیابنے پر ایک بچہ پیدا کرنے والی بھیڑ، بکریاں فروخت کر دینی چاہئیں۔ اسی طرح ایسا مینڈھا یا بکرا جسکی اولاد میں اچھی خوبیاں نہیں ریوڑ سے نکال دینا چاہئے۔ لاغر اور بیمار جانور ریوڑ میں بیماری پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا انکی چھانٹی ضروری ہے۔

## خوراک:

ایسے جھاڑی دار رقبے جو گائیوں اور بھیڑوں کی چرائی کیلئے ناکارہ سمجھے جاتے ہیں۔ وہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ آسانی سے پالے جاسکتے ہیں۔ بھیڑ بکریاں عام چارے مثلاً برسیم، جنتر، مکئی، باجرہ کے علاوہ گھاس پھوس درختوں کے پتے، کیکر کی پھلیاں کھا کر پیٹ بھر لیتی ہیں۔

چرائی اور سبز چارے کے علاوہ مینڈوں اور بکریوں کو نسل کشی کے موسم میں اور بھیڑ بکریوں کو بچہ دینے سے پہلے اور دودھ دینے سے پہلے اور دودھ دینے کے دوران ونڈا کی فراہمی ضروری ہے۔

بچے 15 کلوگرام یا 120 دن کے ہو جائیں تو ماں کا دودھ بند کر دینا چاہئے۔ نمک پیاس میں اضافہ کرتا ہے۔ اور جانور پانی زیادہ پیتا ہے۔ جس سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہاری علاقوں کی چراہ گاہوں میں عام طور پر نمکیات کی کمی ہوتی ہے۔

نڈی بکری کو روزانہ 5 کلوگرام اور بڑی بکری اور بھیڑ کو 8 کلوگرام اور پٹھوری کو 4 کلوگرام چارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باڑے میں چند بگہوں پر نمک کے ڈیلے رکھنے چاہئیں تاکہ جانور حسب ضرورت انہیں چاٹتے رہیں۔

### بھیڑوں میں اون کی کترانی:

پاکستانی بھیڑوں کی اون موٹے ریشے والی ہے۔ جو قالین بانی کے کام آتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ان کی اون 6 ماہ کے وقت سے سال میں دو مرتبہ کتری جائے تو جانوروں کی صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ اور اون کی زیادہ مقدار حاصل ہوتی ہے۔ مارچ، اپریل اور ستمبر اکتوبر بھیڑوں کی اون کترنے کے بہترین موسم ہیں۔ اون آمدنی کا ایک اضافی ذریعہ ہے۔

### حفاظتی ٹیکے:

جانوروں کو حفاظتی ٹیکے سال میں ایک بار ماہ فروری میں لگوائیں۔ نیز جانوروں کی صحت کے بارے میں مقامی سرکاری ہسپتال سے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

### عام بیماریاں اور ان کا تدارک:

بھیڑ بکریوں کی بیماریاں نہ صرف گوشت اور اون کی پیداوار اور معیار کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بلکہ شرح اموات میں اضافہ کا باعث بن کر معیشت پر برا اثر ڈالتی ہیں۔ بھیڑ بکریوں میں عموماً تین قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔

(1) متعدی امراض، (2) غیر متعدی امراض (3) کرمی امراض

- (1) متعدی امراض میں پھڑکی (انٹرکس) انٹیرونا کیسیا (واہ) کنٹینجس ایکٹھیما (منہ پکنا)، ہلیو رو نمونیا، چچک وغیرہ شامل ہیں۔
- (2) غیر متعدی امراض میں بد ہضمی، درد قویخ، دست/چپس، ہمونیا، فٹ رات (پاؤں کا گلنا سڑنا)، اچھارہ شامل ہیں۔
- (3) کرمی بیماریوں میں بیرونی کرم، جگری کرم، پھیپھڑوں کے کرم ہیماٹوکوس اور کدو دانے شامل ہیں۔

کسی بھی بیماری کی صورت میں مقامی سرکاری ہسپتال سے رجوع کریں۔ حفاظتی ٹیکے وقت پر لگوائیں۔ تاکہ جانور بیماریوں سے محفوظ رہیں۔

### بیچنے سے پہلے فریبہ کرنا:

بیچنے سے دو ماہ پہلے ونڈا کا استعمال شروع کر دیں تاکہ جانور فریبہ ہو جائے اور عید الاضحیٰ کے نزدیک بیچیں تاکہ اچھی قیمت پر بک جائیں۔ ایک جانور کو 200 گرام ونڈا روزانہ دینا چاہئے۔